

Médicaments : les repères pour la bouche

FICHE PÉDAGOGIQUE



COMPRENDRE

Certains médicaments peuvent réduire la salive ou nécessiter des précautions avant des soins. Signaler les symptômes et les traitements permet au professionnel de santé d'adapter sa prise en charge.

Comprendre	Un symptôme peut avoir plusieurs causes. Tous les médicaments ne donnent pas les mêmes effets.
Agir	Préparer la liste des traitements pour le dentiste, le médecin ou le pharmacien. Ne rien arrêter seul.
Transmettre	Aider un proche à écrire ses questions, avec son accord et en respectant sa confidentialité.

AGIR ET TRANSMETTRE

Défi : préparer une question à poser au pharmacien. Question : faut-il arrêter seul un traitement parce que la bouche est sèche ? Non. Un professionnel recherche la cause et décide de la conduite adaptée.

Un effet dans la bouche mérite d'être signalé. Toute décision sur un médicament appartient au professionnel de santé qui vous accompagne.

Sources publiques : NIH / NIDCR · Médicaments et bouche sèche (anglais) · NHS · Anticoagulants et précautions avant des soins dentaires (anglais) · NHS · Carie débutante et traitements selon le stade (anglais)

Lire la définition complète et ses autres sources · Cette fiche ne remplace pas un avis médical ou dentaire.

www.assurmeyer.fr

Prévenir mieux ensemble. Assurer moins cher chacun.
Sourire pour tous !

