

# Traumatisme dentaire : les premiers repères

## FICHE INFORMATIVE



### COMPRENDRE

Un choc peut casser, déplacer ou expulser une dent. Une dent expulsée demande un contact immédiat avec un dentiste, même si elle est introuvable.

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dent de lait</b>    | Ne jamais la remettre en place. Contacter rapidement le dentiste.                                                                  |
| <b>Dent définitive</b> | Contactez immédiatement le dentiste. Tenir la dent par la couronne ; si elle n'est pas remise en place, la conserver dans du lait. |
| <b>Fragment cassé</b>  | Conserver le fragment dans du lait, dans un récipient propre, et l'apporter au rendez-vous.                                        |

## LES BONS RÉFLEXES

À partager au foyer : enregistrer le numéro du dentiste et parler des protections adaptées au sport. Votre CSO transmet des repères généraux ; seul le professionnel de santé évalue et traite la blessure.

Dent expulsée : agir tout de suite et joindre le dentiste. Ne jamais remettre une dent de lait en place. Une urgence grave après un choc relève des secours : 15 ou 112 en France.

Sources publiques : NHS · Dent expulsée : agir immédiatement (anglais) · NHS · Dent cassée ou fissurée (anglais) · Hôpital public Alder Hey · Traumatismes et suivi des dents (anglais)

Lire la définition complète et ses autres sources · Cette fiche ne remplace pas un avis médical ou dentaire.

[www.assurmeyer.fr](http://www.assurmeyer.fr)

*Prévenir mieux ensemble. Assurer moins cher chacun.*

**Sourire pour tous !**

